

## Recombinant Mouse FGF-2 (Fibroblast growth factor)

编号： YB058-20HP 规格： 20 µg  
 YB058-100HP 100 µg  
 YB058-500HP 500 µg  
 YB058-1000HP 1 mg

类别： 重组蛋白 应用： Functional Assay

### 产品简介


描述： YOBIBIO 细胞因子/重组蛋白来自于海峡两岸专业的科研工作者自主研发生产，具有高活性、高纯度、低内毒素的卓越品质，所有产品均在 ISO13485/GMP、GLP 和 GTP 标准条件的实验室中完成，全部通过生物活性、内毒素水平、SDS-PAGE、Ni-NTA chromatography 验证和测试，保证产品生物活性与批间一致性，提高结果可信度和可重复性；我们的产品以无载体形式提供，非常适用于细胞培养，ELISA 或免疫印迹标准品的研究与生产。

来源： *Escherichia coli*  
 纯度： >98% as determined by SDS-PAGE. Ni-NTA chromatography.

生物学活性： Measure by its ability to induce 3T3 cells proliferation. The ED50 for this effect is 1.5 ng/mL. The specific activity of recombinant mouse FGF-2 is approximately >1x 10<sup>6</sup> IU/mg.

内毒素检测： 0.1 EU per 1 µg of the protein by the LAL method.

蛋白序列： MALDTNYCFRNLEENCCVRPLYIDFR  
 QDLGWKVVHEPKGYANFCSGPCP  
 YLRSADTTHTSTVLGLYNTLNPEASASP  
 CCVPQDLEPLTILYYVGRTPKVEQLSN  
 MVVKSKCS with polyhistidine tag at the C-terminus.



SDS-PAGE analysis of recombinant mouse FGF-2

## 产品组成

成分： 从含有 1X PBS ,pH8.0 溶液中冻干的蛋白质.

## 产品储存

储存： -20°C冻干粉长期保存.

运输： 蓝冰.

## 产品使用

1、推荐使用无菌水重悬冻干粉，溶液浓度不低于 100μg/mL，并静置至少 20min 以充分溶解.

2、重悬后的溶液可进一步稀释分装，置于 2-8°C有效期 1 个月，-20°C至-80°C有效期 3 个月；避免反复冻融.

3、重悬液进一步稀释分装时，须添加一定量的载体蛋白（0.1%BSA、10%FBS 或 5%HSA），无血清实验需求时，可更换为 5%海藻糖溶液作为载体.

WB=Western Blot; IP=Immunoprecipitation; IF=Immunofluorescence; IHC=Immunohistochemistry;  
FACS=Fluorescence activated Cell Sorting; FA=Functional Assay

更多产品详情请关注 YOBIBIO 官网:

