

## Recombinant Human TPO (Thrombopoietin)

编号：	YB124-5HP YB124-20HP YB124-100HP YB124-500HP YB124-1000HP	规格：	5µg 20µg 100 µg 500 µg 1 mg
类别：	重组蛋白	应用：	Functional Assay

### 产品简介

**描述：** YOBIBIO 细胞因子/重组蛋白具有高活性、高纯度、低内毒素的卓越品质，所有产品均在 ISO13485/GMP、GLP 和 GTP 标准条件的实验室中完成，全部通过生物活性、内毒素水平、SDS-PAGE、Ni-NTA chromatography 验证和测试，保证产品生物活性与批间一致性，提高结果可信度和可重复性；我们的产品以无载体形式提供，非常适用于细胞培养，ELISA 或免疫印迹标准品的研究与生产。。

**来源：** *Escherichia coli*


**纯度：** >95% as determined by SDS-PAGE. Ni-NTA chromatography.

**生物学活性：** Measure by its ability to induce proliferation in MO7e cells. The ED50 for this effect is 2 ng/mL. The specific activity of recombinant human TPO is > 5 x 10<sup>5</sup> IU/mg.

**内毒素检测：** 0.01 EU per 1 µg of the protein by the LAL method.

**蛋白序列：** SPAPPACDLRVLSKLLRDSHVLHSRLS  
QCPEVHPLPTPVLLPAVDFSLGEWKT  
QMEETKAQDILGAVTLLLEGVMAARG  
QLGPTCLSSLLGQLSGQVRLLLGALQS  
LLGTQLPPQGRRTAHKDPNAIFLSFQ  
HLLRGKVRFLMLVGGSTLCVRRAPPT  
TAVPSRTSLVLTNL with  
polyhistidine tag at the N-terminus.

kDa



SDS-PAGE analysis of recombinant human TPO

## 产品组成

成分：            从含有 1X PBS ,pH7.4 溶液中冻干的蛋白质.

## 产品储存

储存：            -20℃冻干粉长期保存.

运输：            蓝冰.

## 产品使用

1、推荐使用无菌水重悬冻干粉，溶液浓度不低于 100μg/mL，并静置至少 20min 以充分溶解.

2、重悬后的溶液可进一步稀释分装，置于 2-8℃有效期 1 个月，-20℃至-80℃有效期 3 个月；避免反复冻融.

3、重悬液进一步稀释分装时，须添加一定量的载体蛋白（0.1%BSA、10%FBS 或 5%HSA），无血清实验需求时，可更换为 5%海藻糖溶液作为载体.

WB=Western Blot; IP=Immunoprecipitation; IF=Immunofluorescence; IHC=Immunohistochemistry;  
FACS=Fluorescence activated Cell Sorting; FA=Functional Assay

更多产品详情请关注 YOBIBIO 官网:

