

## Recombinant Human FGF-18 (Fibroblast growth factor-18)

|     |   |     |   |
|-----|---|-----|---|
| 编号： | YB107-5HP<br>YB107-20HP<br>YB107-100HP<br>YB107-500HP<br>YB107-1000HP | 规格： | 5 µg<br>20 µg<br>100 µg<br>500 µg<br>1 mg |
| 类别： | 重组蛋白  | 应用： | Functional Assay                          |

### 产品简介

**描述：** YOBIBIO 细胞因子/重组蛋白具有高活性、高纯度、低内毒素的卓越品质，所有产品均在 ISO13485/GMP、GLP 和 GTP 标准条件的实验室中完成，全部通过生物活性、内毒素水平、SDS-PAGE、Ni-NTA chromatography 验证和测试，保证产品生物活性与批间一致性，提高结果可信度和可重复性；我们的产品以无载体形式提供，非常适用于细胞培养，ELISA 或免疫印迹标准品的研究与生产。。


**来源：** *Escherichia coli*

**纯度：** >98% as determined by SDS-PAGE. Ni-NTA chromatography.

**生物学活性：** Measure by its ability to induce 3T3 cells proliferation. The ED50 for this effect is 1.3-2.0 ng/mL. The specific activity of recombinant human FGF-18 is > 5 x 10<sup>5</sup> IU/mg.

**内毒素检测：** 0.1 EU per 1 µg of the protein by the LAL method.

**蛋白序列：** MAENVDFRIHVENQTRARDDVSRK  
QLRLYQLYSRTSGKHIQVLGRRISARG  
EDGDKYAQLLVETDTFGSQVRIKGKET  
EFYLCMNRKGKLVGKPDGTSKECVFIE  
KVLNNYTALMSAKYSGWYVGFTKK  
GRPRKGPKTRENQQDVHFMKRYPKG  
QPELQKPFKYTTVTKRSR with  
polyhistidine tag at the C-terminus.



SDS-PAGE analysis of recombinant human FGF-18

## 产品组成

成分： 从含有 1X PBS ,pH8.0 溶液中冻干的蛋白质.

## 产品储存

储存： -20℃冻干粉长期保存.

运输： 蓝冰.

## 产品使用

1、推荐使用无菌水重悬冻干粉，溶液浓度不低于 100μg/mL，并静置至少 20min 以充分溶解.

2、重悬后的溶液可进一步稀释分装，置于 2-8℃有效期 1 个月，-20℃至-80℃有效期 3 个月；避免反复冻融.

3、重悬液进一步稀释分装时，须添加一定量的载体蛋白（0.1%BSA、10%FBS 或 5%HSA），无血清实验需求时，可更换为 5%海藻糖溶液作为载体.

WB=Western Blot; IP=Immunoprecipitation; IF=Immunofluorescence; IHC=Immunohistochemistry;  
FACS=Fluorescence activated Cell Sorting; FA=Functional Assay

更多产品详情请关注 YOBIBIO 官网:

